I'm not a bot

إرشادات نزيف الجهاز الهضمي الحاده

جهاز الهضمي: "نزيف الجهاز الهضمي العلوي" – يصيب المريء، والمعدة، والجزء الأول من الأمعاء الدقيقة. "نزيف الجهاز الهضمي السفلي" – يصيب الأمعاء الغليظة (القولون). كما قد يحدث النزيف في منتصف الأمعاء الدقيقة، ولكن ذلك أقل شيوعًا بكثير. وأحيانًا يُسمى هذا "نزيف منتصف الجهاز الهضمي". تعتمد الأعراض على ما إذا كنت تعاني من نزيف الجهاز الهضمي العلوي أم السفلي. بعض الأشخاص لا تظهر عليهم أي أعراض، ويكتشفون أنهم يعانون عندما يُجرى الطبيب أو الممرض فحصًا شرجيًا لهم أو يبين اختبار الدم أنهم مصابون بما يسمى "فقر الدم" (الأنيميا). (يحدث فقر الدم عندما يكون لدى الشخص عدد أقل مما ينبغي من خلايا الدم الحمراء). قد تشمل أعراض نزيف الجهاز الهضمي العلوي ما يلي: قرح المعدة أو الأمعاء الدقيقة – القرح هي تقرحات في بطانة القناة الهضمية. مشكلات الأوعية الدموية. على سبيل المثال: أوردة منتفخة في المريء تُعرف باسم "الدوالي" أوعية دموية غير طبيعية تُعرف باسم "التشوهات الشريانية الوريدية

intended to direct people to diagnosis and treatment. Do not carry out all your diagnosis and treatment procedures without consulting your doctor. The contents do not contain information about the therapeutic health services of Acibadem Health Group. تحليل

ص. يجب الذهاب فورًا إلى المستشفى إذا شعرت بما يلي: شحوب الوجه، الضعف والإرهاق الشديد، الدوخة، ضيق في النفس، انخفاض ضغط الدم، سرعة النبض، فقدان الوعي. لأن هذه الأعراض قد تشير إلى النزيف الحاد. الشعور بالتعب، ضيق التنفس، قفر الدم أو الأنيميا. بعد معرفة الطبيب للأعراض التي تعاني منها، غالبًا ما يطلب الطبيب بعض الاختبارات التشخيصية لمعرفة مكان النزيف.

تشخيص نزيف الجهاز الهضمي العلوي

يعتمد علاج النزيف المعوي على شدته ومصدره. يُستخدم الأدوية الخاصة بتقليل حموضة المعدة. هذه الأدوية تساعد في شفاء القروح. يمكن تنفيذ عمليات تقنيات تنظيرية أيضًا. تتضمن حقن الأوعية الدموية لوقف النزيف. ويمكن سحب الدم الفاسد من المعدة بالتقنيات الحديثة. في حالات شديدة جدًا، يكون الجراحة الحل الأمثل. تساعد في إعادة النسيج الصار بسبب النزيف. وتحافظ على صحة المريض

diagnosis and treatment. Do not carry out all your diagnosis and treatment procedures without consulting your doctor. The contents do not contain information about the therapeutic health services of Acibadem Health Group.

ودة عن طريق الوريد وقد يكون هناك حاجة إلى نقل الدم إذا كان النزيف حادًا، والهدف هو تثبيت وضع المريض ومنع المضاعفات الناجمة عن فقدان الدم. التنظير الداخلي: يُستخدم التنظير لتحديد مصدر النزيف وإيقافه، ويمكن القيام بذلك عن طريق الكي الحراري أو حقن المواد المصفية للأوعية الدموية أو تركيب مشابك خاصة لوقف النزيف. الأدوية: يوصي الطبيب ببعض الأدوية لتقليل حموضة المعدة وحماية بطانة المعدة. مرض كرون. سرطان المريء. دوالي المريء. التهاب المريء. التهاب المعدة. سرطان الكبد. قرحة المعدة. سرطان المعدة. سرطان البنكرياس. الارتجاع الحمضي المريئي

التزيف، بما في ذلك النزيف الناتج عن القرحة أو البواسير أو مرض الارتجاع المعدي المريئي. التدخل الجراحي: إذا لم يكن بالإمكان السيطرة على النزيف من خلال التنظير أو الأدوية، فقد يكون التدخل الجراحي ضروريًا لإصلاح الأوعية الدموية المتضررة أو إزالة الجزء المتأثر من الجهاز الهضمي. اقرأ أيضًا: التهاب القولون المجهري المصادر