Click to verify

HIDRASEC 10 mg Gr﹐nulos para Soluci﹐n Oral en Sobres FERRER Hidrasec es un medicamento antidiarreico utilizado para condiciones no crónicas de este padecimiento. Funciona mediante la regulación de agua a los intestinos. Nombres Comerciales: Hidrasec Nombre Genérico: Racecadotrilo Presentaciones y Vía de Administración: Cápsulas y granulado para administración oral. Sus usos más frecuentes son para: Diarrea Sus usos en general son: Diarrea aguda, es decir, la que tiene una duración inferior a dos semanas. La diarrea puede representar problemas graves de deshidratación, por lo que debe acompañarse el medicamento con el uso de sueros orales cuando se sospeche que pudiera presentarse esta condición. Siga las instrucciones de su médico para una pronta recuperación. Hidrasec Precio Para encontrar el mejor precio de Hidrasec compara varias farmacias en nuestra próxima sección. Precio Farmacias Chedraui Farmatodo Farmacias San Pablo Farmalisto Cápsulas $182 $180 $180 $174 Sobres – $229.50 $209 $207 **Es importante aclarar que estos precios fueron tomados de la farmacia en línea en una investigación hecha por el equipo de quefarmacia en Marzo 2020, los precios pueden modificarse con el tiempo y la sucursal de la farmacia.** Ambas presentaciones de ese medicamento las consigues más económicas en Farmalisto, quién en comparación con otras farmacias, para las cápsulas se encuentra hasta un 8% más accesibles, y en la presentación en sobres te puedes ahorrar hasta el 20% en comparación con Farmatodo. Presentaciones y forma de administración Cápsulas de 100 mg de Racecadotrilo, en cajas de 6 o 9 piezas. Son fabricadas por Laboratorios Ferrer en la marca comercial Hidrasec. Granulado de 10 y 30 mg de Racecadotrilo. Viene en cajas con 18 sobres. Es fabricado por Laboratorios Ferrer en la marca comercial Hidrasec . Dosis y usos recomendados por edad Presentación 3 meses a 12 años Adultos Veces al día Cápsulas No 100 mg 3 Granulado 10 a 60 mg No 3 *Consulta a tu médico para recibir la dosis correcta. El granulado se puede disolver en agua, combinarse con algún alimento o usar directamente en la boca del niño. Si no se observan resultados en 5 días, consulte nuevamente a su médico. El tratamiento para pacientes adultos es de un máximo de 7 días. La dosis máxima para adultos es de 400 mg al día. En niños es de 8 mg por kg. Generales. Precaución en personas intolerantes a la fructosa, con ausencia de las enzimas sacarasa e isomaltasa, insuficiencia renal o con síndrome de mala absorción de glucosa y galactosa. Alergias o hipersensibilidad. No se use en personas alérgicas al medicamento. Mezcla con alcohol. El alcohol irrita al aparato digestivo. Además, el alcohol deshidrata el organismo, lo que puede generar complicaciones al combinarse con los efectos de la diarrea. Mezclar con otros medicamentos. No se tiene conocimiento hasta la fecha de interacciones con medicamentos. Combinación de Hidrasec en embarazo y lactancia EMBARAZO MEDIO LACTANCIA BAJO RIESGO BAJO Hidrasec, por su ingrediente activo Racecadotrilo, no ha sido clasificado por la FDA (Food & Drug Administration). No se recomienda su uso durante el embarazo por no contarse con estudios en humanos, aunque las pruebas en animales no indican problemas. Según estudios médicos de e-lactancia.org, Hidrasec es compatible con la lactancia y lo considera de muy bajo riesgo. Es además un medicamento apropiado para pediatría, aunque no se tienen estudios suficientes en menores de 3 meses. Efectos secundarios Los efectos secundarios por el uso de este medicamento son mínimos y son similares a los que se obtienen con el uso de placebos. Estos son: Es importante de todas maneras reportar cualquier síntoma al médico. Preste especial atención a los síntomas que pudieran indicar una reacción anafiláctica, es decir, una respuesta alérgica inmediata al medicamento. Estos generalmente se manifiestan con la hinchazón de la cara y la garganta, además de labios y lengua. Fuentes Médicas Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar este medicamento, porque contiene información importante para usted. Siga exactamente las instrucciones de administración del medicamento contenidas en este prospecto o las indicadas por su médico o farmacéutico. Consulte el prospecto en este enlace: Hidrasec es un medicamento antidiarreico utilizado para condiciones no crónicas de este padecimiento. Funciona mediante la regulación de agua a los intestinos. Nombres Comerciales: Hidrasec Nombre Genérico: Racecadotrilo Presentaciones y Vía de Administración: Cápsulas y granulado para administración oral. Sus usos más frecuentes son para: Diarrea Sus usos en general son: Diarrea aguda, es decir, la que tiene una duración inferior a dos semanas. La diarrea puede representar problemas graves de deshidratación, por lo que debe acompañarse el medicamento con el uso de sueros orales cuando se sospeche que pudiera presentarse esta condición. Siga las instrucciones de su médico para una pronta recuperación. Hidrasec Precio Para encontrar el mejor precio de Hidrasec compara varias farmacias en nuestra próxima sección. Precio Farmacias Chedraui Farmatodo Farmacias San Pablo Farmalisto Cápsulas $182 $180 $180 $174 Sobres – $229.50 $209 $207 **Es importante aclarar que estos precios fueron tomados de la farmacia en línea en una investigación hecha por el equipo de quefarmacia en Marzo 2020, los precios pueden modificarse con el tiempo y la sucursal de la farmacia.** Ambas presentaciones de ese medicamento las consigues más económicas en Farmalisto, quién en comparación con otras farmacias, para las cápsulas se encuentra hasta un 8% más accesibles, y en la presentación en sobres te puedes ahorrar hasta el 20% en comparación con Farmatodo. Presentaciones y forma de administración Cápsulas de 100 mg de Racecadotrilo, en cajas de 6 o 9 piezas. Son fabricadas por Laboratorios Ferrer en la marca comercial Hidrasec. Granulado de 10 y 30 mg de Racecadotrilo. Viene en cajas con 18 sobres. Es fabricado por Laboratorios Ferrer en la marca comercial Hidrasec . Dosis y usos recomendados por edad Presentación 3 meses a 12 años Adultos Veces al día Cápsulas No 100 mg 3 Granulado 10 a 60 mg No 3 *Consulta a tu médico para recibir la dosis correcta. El granulado se puede disolver en agua, combinarse con algún alimento o usar directamente en la boca del niño. Si no se observan resultados en 5 días, consulte nuevamente a su médico. El tratamiento para pacientes adultos es de un máximo de 7 días. La dosis máxima para adultos es de 400 mg al día. En niños es de 8 mg por kg. Generales. Precaución en personas intolerantes a la fructosa, con ausencia de las enzimas sacarasa e isomaltasa, insuficiencia renal o con síndrome de mala absorción de glucosa y galactosa. Alergias o hipersensibilidad. No se use en personas alérgicas al medicamento. Mezcla con alcohol. El alcohol irrita al aparato digestivo. Además, el alcohol deshidrata el organismo, lo que puede generar complicaciones al combinarse con los efectos de la diarrea. Mezclar con otros medicamentos. No se tiene conocimiento hasta la fecha de interacciones con medicamentos. Combinación de Hidrasec en embarazo y lactancia EMBARAZO MEDIO LACTANCIA BAJO RIESGO BAJO Hidrasec, por su ingrediente activo Racecadotrilo, no ha sido clasificado por la FDA (Food & Drug Administration). No se recomienda su uso durante el embarazo por no contarse con estudios en humanos, aunque las pruebas en animales no indican problemas. Según estudios médicos de e-lactancia.org, Hidrasec es compatible con la lactancia y lo considera de muy bajo riesgo. Es además un medicamento apropiado para pediatría, aunque no se tienen estudios suficientes en menores de 3 meses. Efectos secundarios Los efectos secundarios por el uso de este medicamento son mínimos y son similares a los que se obtienen con el uso de placebos. Estos son: Es importante de todas maneras reportar cualquier síntoma al médico. Preste especial atención a los síntomas que pudieran indicar una reacción anafiláctica, es decir, una respuesta alérgica inmediata al medicamento. Estos generalmente se manifiestan con la hinchazón de la cara y la garganta, además de labios y lengua. Fuentes Médicas FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN: Cada sobre contiene:Racecadotrilo 10 mg, 30 mgExcipiente cbp INDICACIONES TERAPÉUTICAS: HIDRASEC® es un antidiarreico que está indicado como terapia adjunta a la rehidratación oral o parenteral en el tratamiento de la diarrea aguda en niños y lactantes de 3 meses de edad y mayores. FARMACOCINÉTICA Y FARMACODINAMIA: Propiedades farmacocinéticas: Racecadotrilo se absorbe rápidamente por vía oral. Se hidroliza rápidamente a (RS)-N-(1-oxo-2-(mercaptometil)-3-fenilpropil) glicina; su metabolito activo que es convertido en metabolitos inactivos que se eliminan a través de los riñones, heces y pulmones.El grado y duración de la acción de racecadotrilo depende de la dosis administrada.La actividad máxima contra la encefalinasa plasmática se logra después de 2½ horas y corresponde a la inhibición de 90% de la actividad enzimática después de una dosis administrada de 1,5 mg/kg.La vida media biológica de Racecadotrilo es de 3 horas. Para una dosis de 100 mg, la duración de la actividad contra la encefalinasa plasmática es de 8 horas.El (RS)-N-(1-oxo-2-(mercaptometil)-3-fenilpropil) glicina, el metabolito activo de Racecadotrilo se une a un 90% de la proteína plasmática, principalmente a la albúmina. La distribución tisular sólo afecta alrededor del 1% de la dosis administrada.Las propiedades farmacocinéticas de racecadotrilo no cambian con la administración repetida o en personas mayores. La biodisponibilidad de racecadotrilo no se altera con los alimentos, pero su actividad máxima se retrasa una hora y media.Propiedades farmacodinámicas: HIDRASEC® es un inhibidor de la encefalinasa, la enzima responsable del desdoblamiento de las encefalinas. Es un inhibidor selectivo pero reversible, y protege las encefalinas endógenas que son fisiológicamente activas en el tubo digestivo.HIDRASEC® tiene un agente antisecretor intestinal que ha demostrado no tener ningún efecto en la motilidad gastrointestinal, reduce la hipersecreción intestinal de agua y electrólitos que provoca la toxina del cólera o la inflamación, sin afectar la secreción basal. Por lo tanto, no tiene ningún efecto en el intestino normal.Cuando se administra por vía oral, la inhibición de la encefalinasa sólo es periférica.HIDRASEC® no afecta la actividad de la encefalinasa del sistema nervioso central y no se ha demostrado que produzca hábito, efecto estimulante o sedante en este mismo. CONTRAINDICACIONES: Contraindicado en pacientes con hipersensibilidad conocida a racecadotrilo o algún otro ingrediente de la formulación. Puesto que la sacarosa es una fuente de glucosa y fructosa.HIDRASEC® no debe usarse en personas con intolerancia a la fructosa, síndrome de absorción deficiente de glucosa/galactosa o deficiencia de sacarosa isomaltosa. RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA: No se tienen disponibles datos adecuados del uso en humanos durante el embarazo. Sin embargo, en estudios en animales no se ha identificado ningún riesgo para el embarazo y el desarrollo embrionario-fetal. HIDRASEC® no debe usarse durante el embarazo a menos que los posibles beneficios sobrepasen los riesgos.No se tienen disponibles datos adecuados del uso en humanos durante la lactancia. Sin embargo, en estudios en animales no se ha identificado ningún riesgo d urante la lactancia o para el lactante. REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: Aunque se observaron varios eventos adversos en la población de pruebas clínicas, estos eventos fueron similares en cuanto a su naturaleza y se observaron con la misma frecuencia e intensidad en poblaciones con placebo.No se ha identificado ningún efecto adverso en la capacidad de conducir u operar maquinaria. PRECAUCIONES EN RELACIÓN CON EFECTOS DE CARCINOGÉNESIS, MUTAGÉNESIS, TERATOGÉNESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD: No se ha reportado información de relevancia. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO: No se han realizado estudios específicos en humanos, racecadotrilo no inhibe o estimula el citocromo P-450 en modelos animales. ALTERACIONES EN LOS RESULTADOS DE PRUEBAS DE LABORATORIO: No se han reportado hasta el momento. PRECAUCIONES GENERALES: En pacientes diabéticos, debe tomarse en cuenta el contenido de azúcar por cada sobre, por ejemplo, 580 mg (sobre de 0.5 g) 1740 mg (sobre de 1.8 g) 2900 mg (sobre de 3.0 g) de sacarosa.Si la cantidad de sacarosa (fuente de glucosa y fructosa) proporcionada por HIDRASEC® excede a 5 g/día, deberá tomarse en cuenta en la ración diaria.Deben tomarse precauciones en pacientes con insuficiencia renal o hepática debido a la ausencia de experiencia clínica en estos grupos. DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: HIDRASEC® debe administrarse junto con un tratamiento de rehidratación oral o parenteral en lactantes y niños.La lactancia debe continuar cuando sea el caso.La dosis recomendada para HIDRASEC® es de 1.5 mg/kg de peso corporal, 3 veces al día.La dosis diaria total no debe exceder de aproximadamente 8 mg/kg.En la tabla de abajo se expone la dosis normal según el peso y la edad del lactante o el niño.Considerar el peso del niño para calcular la dosis. Si esto no es posible, tomar la edad del niño. Edad No. de sobres por toma De 3 a 9 meses (menos de 9 kg aprox.) 1 sobre de 10 mg por toma De 9 a 30 meses (de 9 a 12 kg aprox.) 2 sobres de 10 mg por toma De 30 meses a 9 años (de 13 a 27 kg aprox.) 1 sobre de 30 mg por toma Más de 9 años (más de 27 kg) 2 sobres de 30 mg por toma Junto con las sales de rehidratación oral, el tratamiento debe de iniciarse con el número de sobres recomendados sin tomar en cuenta el tiempo. Las dosis subsecuentes deben administrarse cada 8 horas hasta que cese la diarrea.Si los síntomas persisten por más de 5 días, el paciente debe de acudir a consulta médica. Instrucciones de uso: 1. Directamente en la boca del niño. HIDRASEC® puede administrarse vaciando el contenido de los sobres directamente sobre la lengua del niño. 2. Con agua. Abra el sobre de HIDRASEC® pediátrico cortando por la parte superior como está indicado. Vierta los gránulos de HIDRASEC® a una pequeña cantidad de agua limpia. Agite el agua y los gránulos vigorosamente y dé a beber al niño inmediatamente. 3. Con alimentos. HIDRASEC® también puede mezclarse con una pequeña cantidad de alimento en una cuchara. Cualquiera que sea el método de administración, es importante asegurarse que el niño ingiera toda la dosis requerida. MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL: No existen datos de sobredosificación en niños, sin embargo, en adultos, en los estudios clínicos se han administrado dosis únicas de 2 g (es decir 20 veces la dosis para adulto en el tratamiento de diarrea aguda) sin causar efectos dañinos.No se ha reportado ningún caso de sobredosificación accidental. No se ha identificado ningún antídoto específico, en caso de sobredosificación deben seguirse los procedimientos reconocidos. PRESENTACIONES: Caja con 18 sobres de 10 mg e instructivo anexo.Caja con 18 sobres de 30 mg e instructivo anexo. RECOMENDACIONES SOBRE ALMACENAMIENTO: Consérvese a no más de 30°C.Consérvese la caja bien cerrada. LEYENDAS DE PROTECCIÓN: No se deje al alcance de los niños. Su venta requiere receta médica. Literatura exclusiva para médicos. No use durante el embarazo o lactancia. Antes de administrar, léase instructivo anexo. Reporte las sospechas de reacción adversa al correo: farmacovigilancia@cofepris.gob.mx ymfarmacovigilancia@ferrer.com Hecho en España por: Ferrer Internacional, S.A. c/, Joan Buscallà, 1-9 08173 Sant Cugat del Vallès Barcelona, España Representante legal e importador: Ferrer Therapeutics, S.A. de C.V. Av. Insurgentes Sur 664, piso 9 Col. Del Valle, C.P. 03100 Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, México Almacenado y Distribuido por: FERRER THERAPEUTICS, S.A. de C.V. Prolongación Saturno No. 456-B, Bodega 5 Col. Nueva Industrial Vallejo, C.P. 07700 Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, México Reg. Núm. 125M2000, SSA IV ®Marca Registrada Hidrasec es un medicamento antidiarreico utilizado para condiciones no crónicas de este padecimiento. Funciona mediante la regulación de agua a los intestinos. Nombres Comerciales: Hidrasec Nombre Genérico: Racecadotrilo Presentaciones y Vía de Administración: Cápsulas y granulado para administración oral. Sus usos más frecuentes son para: Diarrea Sus usos en general son: Diarrea aguda, es decir, la que tiene una duración inferior a dos semanas. La diarrea puede representar problemas graves de deshidratación, por lo que debe acompañarse el medicamento con el uso de sueros orales cuando se sospeche que pudiera presentarse esta condición. Siga las instrucciones de su médico para una pronta recuperación. Hidrasec Precio Para encontrar el mejor precio de Hidrasec compara varias farmacias en nuestra próxima sección. Precio Farmacias Chedraui Farmatodo Farmacias San Pablo Farmalisto Cápsulas $182 $180 $180 $174 Sobres – $229.50 $209 $207 **Es importante aclarar que estos precios fueron tomados de la farmacia en línea en una investigación hecha por el equipo de quefarmacia en Marzo 2020, los precios pueden modificarse con el tiempo y la sucursal de la farmacia.** Ambas presentaciones de ese medicamento las consigues más económicas en Farmalisto, quién en comparación con otras farmacias, para las cápsulas se encuentra hasta un 8% más accesibles, y en la presentación en sobres te puedes ahorrar hasta el 20% en comparación con Farmatodo. Presentaciones y forma de administración Cápsulas de 100 mg de Racecadotrilo, en cajas de 6 o 9 piezas. Son fabricadas por Laboratorios Ferrer en la marca comercial Hidrasec. Granulado de 10 y 30 mg de Racecadotrilo. Viene en cajas con 18 sobres. Es fabricado por Laboratorios Ferrer en la marca comercial Hidrasec . Dosis y usos recomendados por edad Presentación 3 meses a 12 años Adultos Veces al día Cápsulas No 100 mg 3 Granulado 10 a 60 mg No 3 *Consulta a tu médico para recibir la dosis correcta. El granulado se puede disolver en agua, combinarse con algún alimento o usar directamente en la boca del niño. Si no se observan resultados en 5 días, consulte nuevamente a su médico. El tratamiento para pacientes adultos es de un máximo de 7 días. La dosis máxima para adultos es de 400 mg al día. En niños es de 8 mg por kg. Generales. Precaución en personas intolerantes a la fructosa, con ausencia de las enzimas sacarasa e isomaltasa, insuficiencia renal o con síndrome de mala absorción de glucosa y galactosa. Alergias o hipersensibilidad. No se use en personas alérgicas al medicamento. Mezcla con alcohol. El alcohol irrita al aparato digestivo. Además, el alcohol deshidrata el organismo, lo que puede generar complicaciones al combinarse con los efectos de la diarrea. Mezclar con otros medicamentos. No se tiene conocimiento hasta la fecha de interacciones con medicamentos. Combinación de Hidrasec en embarazo y lactancia EMBARAZO MEDIO LACTANCIA BAJO RIESGO BAJO Hidrasec, por su ingrediente activo Racecadotrilo, no ha sido clasificado por la FDA (Food & Drug Administration). No se recomienda su uso durante el embarazo por no contarse con estudios en humanos, aunque las pruebas en animales no indican problemas. Según estudios médicos de e-lactancia.org, Hidrasec es compatible con la lactancia y lo considera de muy bajo riesgo. Es además un medicamento apropiado para pediatría, aunque no se tienen estudios suficientes en menores de 3 meses. Efectos secundarios Los efectos secundarios por el uso de este medicamento son mínimos y son similares a los que se obtienen con el uso de placebos. Estos son: Es importante de todas maneras reportar cualquier síntoma al médico. Preste especial atención a los síntomas que pudieran indicar una reacción anafiláctica, es decir, una respuesta alérgica inmediata al medicamento. Estos generalmente se manifiestan con la hinchazón de la cara y la garganta, además de labios y lengua. Fuentes Médicas No tome Hidrasec Si es alérgico al racecadotrilo o a cualquiera de los demás componentes de este medicamento (incluidos en la sección 6). Si alguna vez ha desarrollado una erupción cutánea grave o descamación de la piel, ampollas y/o llagas en la boca después de tomar racecadotrilo. Advertencias y precauciones Consulte a su médico o farmacéutico antes de empezar a tomar Hidrasec si: - hay sangre o pus en sus deposiciones o si tiene fiebre. La causa de la diarrea puede ser una infección bacteriana que debe ser tratada por su médico, - tiene diarrea crónica o diarrea causada por antibióticos, - tiene una enfermedad de riñón o del hígado, - tiene vómitos prolongados o incontrolados, Se han comunicado reacciones en la piel con el uso de este producto. En la mayoria de los casos éstas han sido leves o moderadas. En caso de experimentar reacciones graves en la piel, el tratamiento tiene que ser interrumpido de inmediato. Si no se observa mejoría en 48 horas, interrumpa el tratamiento y consulte a su médico. Se han notificado reacciones cutáneas graves, incluyendo reacción a fármaco con eosinofilia y síntomas sistémicos (DRESS), asociados con el tratamiento con racecadotrilo. Suspenda el uso de racecadotrilo y busque atención médica inmediatamente si nota alguno de los síntomas relacionados con estas reacciones cutáneas graves descritas en la sección 4 Los pacientes con diarrea deben beber abundantes líquidos, para evitar la deshidratación que se manifiesta por sequedad de boca, sed excesiva, disminución de la cantidad de orina, piel arrugada, mareo, aturdimiento. Esto es especialmente importante en personas de edad avanzada. Niños y adolescentes Hidrasec no debe ser utilizado en niños y adolescentes. Uso de Hidrasec con otros medicamentos Comunique a su médico o farmacéutico si está tomando, ha tomado recientemente o podría tener que tomar cualquier otro medicamento. Especialmente informe a su médico si toma alguno de los siguientes medicamentos: - inhibidor de la ECA (por ejemplo, captopril, enalapril, lisinopril, perindopril, ramipril) utilizado para disminuir la presión arterial o facilitar el trabajo cardíaco. Embarazo, lactancia y fertilidad No se recomienda el uso de Hidrasec si está embarazada o piensa que puede estarlo, o si está en periodo de lactancia. Conducción y uso de máquinas Hidrasec tiene poco efecto, o no tiene, en la capacidad de conducir o manejar maquinaria. Hidrasec contiene lactosa Hidrasec contiene lactosa. Si su médico la ha indicado que padece una intolerancia a ciertos azúcares, consulte con él antes de tomar este medicamento.. Hidrasec es un medicamento antidiarreico utilizado para condiciones no crónicas de este padecimiento. Funciona mediante la regulación de agua a los intestinos. Nombres Comerciales: Hidrasec Nombre Genérico: Racecadotrilo Presentaciones y Vía de Administración: Cápsulas y granulado para administración oral. Sus usos más frecuentes son para: Diarrea Sus usos en general son: Diarrea aguda, es decir, la que tiene una duración inferior a dos semanas. La diarrea puede representar problemas graves de deshidratación, por lo que debe acompañarse el medicamento con el uso de sueros orales cuando se sospeche que pudiera presentarse esta condición. Siga las instrucciones de su médico para una pronta recuperación. Hidrasec Precio Para encontrar el mejor precio de Hidrasec compara varias farmacias en nuestra próxima sección. Precio Farmacias Chedraui Farmatodo Farmacias San Pablo Farmalisto Cápsulas $182 $180 $180 $174 Sobres – $229.50 $209 $207 **Es importante aclarar que estos precios fueron tomados de la farmacia en línea en una investigación hecha por el equipo de quefarmacia en Marzo 2020, los precios pueden modificarse con el tiempo y la sucursal de la farmacia.** Ambas presentaciones de ese medicamento las consigues más económicas en Farmalisto, quién en comparación con otras farmacias, para las cápsulas se encuentra hasta un 8% más accesibles, y en la presentación en sobres te puedes ahorrar hasta el 20% en comparación con Farmatodo. Presentaciones y forma de administración Cápsulas de 100 mg de Racecadotrilo, en cajas de 6 o 9 piezas. Son fabricadas por Laboratorios Ferrer en la marca comercial Hidrasec. Granulado de 10 y 30 mg de Racecadotrilo. Viene en cajas con 18 sobres. Es fabricado por Laboratorios Ferrer en la marca comercial Hidrasec . Dosis y usos recomendados por edad Presentación 3 meses a 12 años Adultos Veces al día Cápsulas No 100 mg 3 Granulado 10 a 60 mg No 3 *Consulta a tu médico para recibir la dosis correcta. El granulado se puede disolver en agua, combinarse con algún alimento o usar directamente en la boca del niño. Si no se observan resultados en 5 días, consulte nuevamente a su médico. El tratamiento para pacientes adultos es de un máximo de 7 días. La dosis máxima para adultos es de 400 mg al día. En niños es de 8 mg por kg. Generales. Precaución en personas intolerantes a la fructosa, con ausencia de las enzimas sacarasa e isomaltasa, insuficiencia renal o con síndrome de mala absorción de glucosa y galactosa. Alergias o hipersensibilidad. No se use en personas alérgicas al medicamento. Mezcla con alcohol. El alcohol irrita al aparato digestivo. Además, el alcohol deshidrata el organismo, lo que puede generar complicaciones al combinarse con los efectos de la diarrea. Mezclar con otros medicamentos. No se tiene conocimiento hasta la fecha de interacciones con medicamentos. Combinación de Hidrasec en embarazo y lactancia EMBARAZO MEDIO LACTANCIA BAJO RIESGO BAJO Hidrasec, por su ingrediente activo Racecadotrilo, no ha sido clasificado por la FDA (Food & Drug Administration). No se recomienda su uso durante el embarazo por no contarse con estudios en humanos, aunque las pruebas en animales no indican problemas. Según estudios médicos de e-lactancia.org, Hidrasec es compatible con la lactancia y lo considera de muy bajo riesgo. Es además un medicamento apropiado para pediatría, aunque no se tienen estudios suficientes en menores de 3 meses. Efectos secundarios Los efectos secundarios por el uso de este medicamento son mínimos y son similares a los que se obtienen con el uso de placebos. Estos son: Es importante de todas maneras reportar cualquier síntoma al médico. Preste especial atención a los síntomas que pudieran indicar una reacción anafiláctica, es decir, una respuesta alérgica inmediata al medicamento. Estos generalmente se manifiestan con la hinchazón de la cara y la garganta, además de labios y lengua. Fuentes Médicas HIDRASEC C﹐psulas | Comprar FERRER Hidrasec es un medicamento antidiarreico utilizado para condiciones no crónicas de este padecimiento. Funciona mediante la regulación de agua a los intestinos. Nombres Comerciales: Hidrasec Nombre Genérico: Racecadotrilo Presentaciones y Vía de Administración: Cápsulas y granulado para administración oral. Sus usos más frecuentes son para: Diarrea Sus usos en general son: Diarrea aguda, es decir, la que tiene una duración inferior a dos semanas. La diarrea puede representar problemas graves de deshidratación, por lo que debe acompañarse el medicamento con el uso de sueros orales cuando se sospeche que pudiera presentarse esta condición. Siga las instrucciones de su médico para una pronta recuperación. Hidrasec Precio Para encontrar el mejor precio de Hidrasec compara varias farmacias en nuestra próxima sección. Precio Farmacias Chedraui Farmatodo Farmacias San Pablo Farmalisto Cápsulas $182 $180 $180 $174 Sobres – $229.50 $209 $207 **Es importante aclarar que estos precios fueron tomados de la farmacia en línea en una investigación hecha por el equipo de quefarmacia en Marzo 2020, los precios pueden modificarse con el tiempo y la sucursal de la farmacia.** Ambas presentaciones de ese medicamento las consigues más económicas en Farmalisto, quién en comparación con otras farmacias, para las cápsulas se encuentra hasta un 8% más accesibles, y en la presentación en sobres te puedes ahorrar hasta el 20% en comparación con Farmatodo. Presentaciones y forma de administración Cápsulas de 100 mg de Racecadotrilo, en cajas de 6 o 9 piezas. Son fabricadas por Laboratorios Ferrer en la marca comercial Hidrasec. Granulado de 10 y 30 mg de Racecadotrilo. Viene en cajas con 18 sobres. Es fabricado por Laboratorios Ferrer en la marca comercial Hidrasec . Dosis y usos recomendados por edad Presentación 3 meses a 12 años Adultos Veces al día Cápsulas No 100 mg 3 Granulado 10 a 60 mg No 3 *Consulta a tu médico para recibir la dosis correcta. El granulado se puede disolver en agua, combinarse con algún alimento o usar directamente en la boca del niño. Si no se observan resultados en 5 días, consulte nuevamente a su médico. El tratamiento para pacientes adultos es de un máximo de 7 días. La dosis máxima para adultos es de 400 mg al día. En niños es de 8 mg por kg. Generales. Precaución en personas intolerantes a la fructosa, con ausencia de las enzimas sacarasa e isomaltasa, insuficiencia renal o con síndrome de mala absorción de glucosa y galactosa. Alergias o hipersensibilidad. No se use en personas alérgicas al medicamento. Mezcla con alcohol. El alcohol irrita al aparato digestivo. Además, el alcohol deshidrata el organismo, lo que puede generar complicaciones al combinarse con los efectos de la diarrea. Mezclar con otros medicamentos. No se tiene conocimiento hasta la fecha de interacciones con medicamentos. Combinación de Hidrasec en embarazo y lactancia EMBARAZO MEDIO LACTANCIA BAJO RIESGO BAJO Hidrasec, por su ingrediente activo Racecadotrilo, no ha sido clasificado por la FDA (Food & Drug Administration). No se recomienda su uso durante el embarazo por no contarse con estudios en humanos, aunque las pruebas en animales no indican problemas. Según estudios médicos de e-lactancia.org, Hidrasec es compatible con la lactancia y lo considera de muy bajo riesgo. Es además un medicamento apropiado para pediatría, aunque no se tienen estudios suficientes en menores de 3 meses. Efectos secundarios Los efectos secundarios por el uso de este medicamento son mínimos y son similares a los que se obtienen con el uso de placebos. Estos son: Es importante de todas maneras reportar cualquier síntoma al médico. Preste especial atención a los síntomas que pudieran indicar una reacción anafiláctica, es decir, una respuesta alérgica inmediata al medicamento. Estos generalmente se manifiestan con la hinchazón de la cara y la garganta, además de labios y lengua. Fuentes Médicas El HIDRASEC 100 MG CAPSULAS DURAS es un medicamento fabricado por Bioprojet Ferrer, y autorizado por la AEMPS el 01/08/2013 con el número de registro: 77809. Contiene 1 principio activo: RACECADOTRILO. Laboratorio Bioprojet Ferrer Principio Activo RACECADOTRILO (4) Codigo ATC A07XA04 comercializado NO Observaciones Medicamento Sujeto A Prescripción Médica conduccion No triangulo_amarillo NO Cod Nacional Espcialidad Principios Activos Comercializado Autorizado Revocado PVP 698834HIDRASEC 100 MG CAPSULAS DURASRacecadotrilo No comercializado 01/08/2013698833HIDRASEC 100 MG CAPSULAS DURASRacecadotrilo No comercializado 01/08/2013 PROSPECTO: INFORMACIÓN PARA EL USUARIO Hidrasec 100 mg cápsulas duras Racecadotrilo Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar el medicamento. - Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo. - Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico. - Este medicamento se le ha recetado a usted y no debe dárselo a otras personas aunque tengan los mismos síntomas que usted, ya que puede perjudicarles. - Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto. Ver sección 4. Contenido del prospecto: 1. Qué es Hidrasec y para qué se utiliza 2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar Hidrasec 3. Cómo tomar Hidrasec 4. Posibles efectos adversos 5. Conservación de Hidrasec 6. Contenido del envase e información adicional 1. QUÉ ES HIDRASEC Y PARA QUÉ SE UTILIZA Hidrasec es un medicamento para el tratamiento de la diarrea. Hidrasec se usa en el tratamiento de los síntomas de la diarrea aguda en adultos, cuando las causas de la diarrea no puedan tratarse. Si es posible el tratamiento causal, racecadotrilo puede administrarse como tratamiento complementario. 2. QUÉ NECESITA SABER ANTES DE EMPEZAR A TOMAR HIDRASEC No tome Hidrasec Si es alérgico al racecadotrilo o a cualquier a de los demás componentes de este medicamento (incluidos en la sección 6). Advertencias y precauciones Consulte a su médico o farmacéutico antes de empezar a tomar Hidrasec. Debe decirle a su médico si: - hay sangre o pus en sus deposiciones y si tiene fiebre. La causa de la diarrea puede ser una infección bacteriana que debe ser tratada por su médico, - sufre de diarrea crónica o de diarrea causada por antibióticos, - tiene una enfermedad de riñón o la función del hígado insuficiente, - sufre de vómitos prolongados o incontrolados, - tiene intolerancia a la lactosa (ver "Información importante sobre algunos de los componentes de Hidrasec"). Uso de Hidrasec con otros medicamentos Por favor, informe a su médico si está utilizando o ha utilizando recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta. Embarazo, lactancia y fertilidad No se recomienda el uso de Hidrasec si está embarazada o piensa que puede estarlo, o si está en periodo de lactancia. Consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar cualquier medicamento. Conducción y uso de máquinas Hidrasec tiene poco efecto, o no tiene, en la capacidad de conducir o manejar maquinaria. Información importante sobre algunos de los componentes de Hidrasec Hidrasec contiene lactosa (un tipo de azúcar). Si su médico le ha dicho que tiene intolerancia a algunos azúcares, pregunte a su médico antes de tomar Hidrasec. Este medicamento no contiene gluten. 3. CÓMO TOMAR HIDRASEC Hidrasec se presenta en forma de cápsulas. Siga exactamente las instrucciones de administración de este medicamento indicadas por su médico o farmacéutico. En caso de duda, consulte de nuevo a su médico o farmacéutico. La dosis habitual es de una cápsula tres veces al día que debe tragarse acompañada de un vaso de agua. Hidrasec debe tomarse preferentemente antes de las comidas principales pero, para empezar con su tratamiento, puede tomar una cápsula de Hidrasec en cualquier momento del día. Su médico le indicará la duración del tratamiento con Hidrasec. El tratamiento debe mantenerse hasta que se produzcan 2 deposiciones normales, sin exceder los 7 días. Para compensar la pérdida de líquido debido a su di arrea, este medicamento debe usarse junto con una restitución adecuada de fluidos y sales (electrolitos). La mejor restitución de los fluidos y las sales se consigue con una solución llamada de rehidrat ación oral (por favor, pregunte a su médico o farmacéutico si no está seguro). No se requiere el ajuste de la dosis en ancianos. Uso en niños Para el uso en niños y bebés existen otras formas de Hidrasec. Si toma más Hidrasec del que debe Si toma más Hidrasec del que debiera, por favor, contacte inmediatamente con su médico o farmacéutico. Si olvida tomar Hidrasec No tome una dosis doble para compensar una dos is olvidada. Simplemente continúe con el tratamiento. 4. POSIBLES EFECTOS ADVERSOS Al igual que todos los medicamentos, este medi camento puede producir ef ectos adversos, aunque no todas las personas los sufran. El efecto adverso más frecuente es dolor de cabeza (afecta a entre 1 y 10 de cada 100 pacientes). Se han descrito los siguientes efectos adversos poco frecuentes (afectan a entre 1 y 10 de cada 1.000 pacientes): erupción y eritema (enrojecimiento de la piel). Otros efectos adversos de frecuencia desconocida (l a frecuencia no puede estimarse a partir de los datos disponibles) son: eritema multiforme (lesiones rojizas en las extremidades e interior de la boca), hinchazón de lengua, hinchazón de cara, hinchazón de los labios, hinch azón de los párpados, angioedema (hinchazón bajo la piel en dive rsas partes del cuerpo), urticaria, eritema nodoso (inflamación en forma de bultos bajo la piel), er upción papular (erupción en la piel con lesiones pequeñas, duras y abultadas), prurigo (lesiones en la piel con picor), prurito (picor generalizado) y erupción tóxica de la piel. Deje de tomar HIDRASEC y contacte inmediatamen te con un médico si experimenta síntomas de angioedema, como: hinchazón de la cara, lengua o faringe dificultad para tragar ronchas y dificultad para respirar Comunicación de efectos adversos Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, cons ulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en este prospecto. También puede comunicarlos directamente a través del Sistema Español de Fa rmacovigilancia de Medi camentos de Uso Humano Website: www.notificaRAM.es. Mediante la comunicación de efec tos adversos usted puede contribuir a proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento. 5. CONSERVACIÓN DE HIDRASEC Mantener este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños. No utilice Hidrasec después de la fecha de caducidad que aparece en la caja después de CAD. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica. Los medicamentos no se deben tirar por los desa gües ni a la basura. Deposite los envases y los medicamentos que no necesita en el Punto SIGRE de la farmacia. En caso de duda pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente. No requiere condiciones especiales de conservación. 6. CONTENIDO DEL EN